UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9059 /SNNMT-TTCN
V/v triển khai diệt chuột bảo vệ sản xuất

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Chuột là đối tượng dịch hại nguy hiểm, gây hại thường xuyên, khả năng sinh sản nhanh, phá hoại trên tất cả các loại cây trồng như lúa, ngô, rau màu...; kho tàng, nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp và lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng. Những năm gần đây chuột có xu hướng phát sinh gây hại nặng trên các đối tượng cây trồng, nhất là trên cây lúa; năm 2026, diện tích chuột gây hại trên cây trồng gần 1.000ha (vụ Xuân 630ha, vụ Hè Thu 330ha), tập trung gây hại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Để bảo vệ an toàn sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm, tập trung chỉ đạo, phát động và triển khai diệt chuột đồng loạt trên quy mô rộng tại các xã, phường đến tận hộ dân, trong đó cần lưu ý các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, qua các cuộc họp tại thôn, xóm về nguy cơ, tác hại của chuột đối với sản xuất và đời sống; vận động người dân chủ động, tích cực triển khai các biện pháp diệt chuột để bảo vệ mùa màng; nghiêm cấm việc dùng điện, kích điện để diệt chuột.

2. Chỉ đạo Phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã; huy động các lực lượng các tổ chức, đoàn thể và người dân tham gia phong trào diệt chuột tại địa phương, thực hiện đồng loạt, trên diện rộng, đúng thời điểm và kết hợp nhiều biện pháp an toàn để đạt hiệu quả cao, cụ thể:

- *Biện pháp canh tác*

Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang bờ bụi, ruộng bỏ hoang, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ, thu dọn rơm rạ sau thu hoạch để hạn chế nơi cư trú của chuột.

Xác định thời vụ thích hợp, ở những vùng thường bị chuột hại nặng cần gieo trồng và thu hoạch đồng loạt. Cắt đứt nguồn thức ăn để chuột thiếu thức ăn và dễ dàng ăn mồi bả hơn.

- *Biện pháp thủ công:* Được áp dụng phổ biến, có hiệu quả cao, ít ảnh hưởng đến môi trường, có thể áp dụng một số biện pháp để bắt chuột như: Dùng đèn để soi bắt chuột vào ban đêm; đào bắt, hun khói hoặc đổ nước vào hang chuột; sử dụng các loại bẫy bắt thủ công (bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy dính,…) ở các

vùng đất cao ráo không bị ngập nước, bờ bụi ven làng và những nơi chuột tập trung trú ẩn nhiều. Chuột rất thính tai, có khả năng cảm nhận mùi, vị rất tốt và có tính đa nghi nên hay nghi ngờ chỗ lạ, thức ăn lạ, mùi lạ, do đó khi đặt bẫy cần đặt sát chân tường, bờ ruộng, trên đường mòn quen thuộc chuột hay đi lại, bẫy sau khi bắt chuột cần được làm sạch mùi.

- *Biện pháp sinh học:* Chú trọng công tác bảo vệ, phát triển các loài thiên địch của chuột bằng hình thức khuyến khích người dân nuôi mèo, tuyên truyền và phổ biến cho nhân dân không săn bắt, giết thịt các thiên địch của chuột có trong tự nhiên như rắn, các loài chim,...Sử dụng một số chế phẩm sinh học, thuốc có tác dụng gây bệnh và lây bệnh trong đàn chuột.

- *Biện pháp sử dụng thuốc trừ chuột:* Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các hoạt chất thuộc nhóm chống đông máu, ít độc hại với người, vật nuôi,…như: Bromadiolone, Diphacinone, Brodifacoum; Coumatetralyl,… Các loại thuốc thương phẩm có trên thị trường: Gimlet 0.2GB, Kaletox 200WP, Linh Miêu 0.5WP, Klerat 0,005% Wax Block Bait, Vifarat 0.005% AB, Broma 0,005AB, Kingcat 0.05 RB, Cat 0.25WP,...

Cách đặt bả: Đặt bả vào lúc chiều mát trước khi trời tối, tránh những ngày trời mưa. Khi tổ chức đánh bả, sử dụng mồi không có thuốc trước 2 - 3 ngày, sau đó mới trộn thuốc vào bả để tránh hiện tượng "nhát bả"; dùng muỗng để lấy bả, thuốc thay cho dùng tay trần vì hơi người có thể lưu lại; các vật liệu dùng để lót bả, thuốc đồng nhất với môi trường. Đặt bả trên đường đi lại của chuột, gần cửa hang, nơi chuột đang phá hại,…Khoảng cách đặt bả tùy theo mật độ chuột trên đồng ruộng.

Lưu ý: Trong thời gian phát động diệt chuột bằng biện pháp sử dụng thuốc phải thông báo rộng rãi cho người dân biết để đảm bảo an toàn cho người và sản xuất, nhất là việc quản lý chặt chẽ chăn thả gia súc, gia cầm; thu nhặt chuột chết, mồi thừa tiến hành chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Thời điểm tổ chức diệt chuột: Hiện nay trên đồng ruộng nguồn thức ăn khan hiếm chuột sẽ thu hẹp nơi cư trú và tập trung di chuyển đến các khu vực cao cưỡng, gò đồi, bờ thửa và sống co cụm, tập trung, đây là thời điểm diệt chuột mang lại hiệu quả cao; các địa phương căn cứ điều kiện sản xuất thực tế trên đồng ruộng có thể áp dụng nhiều biện pháp (canh tác, thủ công, sinh học, hóa học) để diệt chuột:

Giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất (khi đồng ruộng không có lúa), tốt nhất ở thời kỳ đổ ải, làm đất đồng loạt và thời điểm đầu các vụ sản xuất (thời gian tiến hành vào tháng 11, tháng 12, trước sản xuất vụ Xuân và cuối tháng 5, đầu tháng 6 sau khi thu hoạch lúa Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu), trên đồng đang

thiếu thức ăn, tổ chức ra quân diệt chuột tập trung, đồng loạt, phát huy hiệu quả và chủ động bảo vệ sản xuất.

Giai đoạn lúa đứng cái làm đòng (thời gian tiến hành vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 và trung tuần tháng 7, đầu tháng 8). Thời điểm chuột bước vào thời kỳ sinh sản và nuôi con, chuột có xu hướng đào hang làm nơi trú ngụ và sinh sản, ưu tiên việc áp dụng biện pháp đào hang diệt chuột, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV.

3. Giao Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, triển khai công tác diệt chuột. Báo cáo kết quả sau các đợt diệt chuột và tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, PGĐ sở;
- Chi cục TTCN;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH HÀ TĨNH

Nguyễn Thanh Hải